

# CIRCULAIRE

## CIR-42/2006

Document consultable dans Médi@m

**Date :**

24/08/2006

**Domaine(s) :**

Risques professionnels

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Nouveau        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modificatif    | <input type="checkbox"/>            |
| Complémentaire | <input type="checkbox"/>            |
| Suivi          | <input type="checkbox"/>            |

**Objet :**

Modification des tableaux de maladie professionnelle

**Liens :**

**Plan de classement :**

26

**Emetteurs :**

DRP

**Pièces jointes :**

**à Mesdames et Messieurs les**

☒ **Directeurs**

☒ CPAM

☒ CRAM

☐ URCAM

☐ UGECAM

☒ CGSS

☐ CTI

☐ **Agents Comptables**

☒ **Médecins Conseils**

☒ Régionaux

☒ Chef de service

☒ Médecin Chef de la Réunion

Pour mise en oeuvre immédiate

**Résumé :**

Modifications des tableaux de maladies professionnelles n° 51 et n° 62 relatifs respectivement aux "maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants" et aux "affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques" par décret n° 2006-985 et n° 2006-986 du 1er août 2006.

**Mots clés :**

Modification ; tableau de maladies professionnelles

**Le Directeur  
des Risques Professionnels**



**Gilles EVRARD**

## CIRCULAIRE : 42/2006

Date : 24/08/2006

Objet : Modification des tableaux de maladie professionnelle

Affaire suivie par : Ellen CADI - ☎ 01 72 60 10 05 - Noëlie ROY - ☎ 01 72 60 18 07

Les tableaux n° 51 et n° 62 relatifs respectivement aux « *maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants* » et aux « *affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques* » ont fait l'objet d'une révision par décret n° 2006-985 et n° 2006-986 du 1<sup>er</sup> août 2006, JO n° 179 du 4 août 2006.

La présente circulaire fait donc le point sur les modifications intervenues.

Concernant le nouveau tableau n° 51 figurant ci-dessous, le décret du 1<sup>er</sup> août 2006 n'a pas directement modifié son contenu. La nouveauté consiste seulement en ce qu'une annotation y a été ajoutée. Celle-ci rappelle que bien que le tableau n° 51 ne comporte pas en lui-même le syndrome de la rhinite ou de l'asthme, ces pathologies peuvent aussi être provoquées par certains constituants de résine pour lesquels il existe d'autres tableaux de prise en charge.

**Tableau 51**

*Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants (\*)*

| DÉSIGNATION DES MALADIES                                                                                       | DÉLAI DE PRISE en charge | LISTE LIMITATIVE des travaux susceptibles de provoquer ces maladies                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. | 15 jours                 | Préparation des résines époxydiques.<br>Emploi des résines époxydiques :<br>– fabrication des stratifiés ;<br>– fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures à base de résines époxydiques. |

(\*) Certains constituants des résines époxydiques, utilisés comme durcisseurs ou adjuvants, peuvent induire des maladies respiratoires allergiques professionnelles indemnissables. Il s'agit en particulier :

- des amines aromatiques : rhinite et asthme (tableau 15 bis) ;
- des amines aliphatiques : rhinite et asthme (tableau 49 bis) ;
- des anhydrides d'acides volatils : rhinite et asthme (tableau 66), pneumopathie d'hypersensibilité (tableau 66 bis) ;
- de l'azodicarbonamide : rhinite et asthme (tableau 66).

Quant au tableau n° 62 également représenté, la nouveauté apportée par le décret du 1<sup>er</sup> août 2006 réside dans la prise en compte de deux nouveaux syndromes : la pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë et la pneumopathie d'hypersensibilité chronique.

**Tableau 62**

*Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques*

| DÉSIGNATION DES MALADIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DÉLAI DE PRISE en charge | LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blépharo-conjonctivite récidivante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 jours                  | Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :<br><br>– fabrication et application de vernis et laques de polyuréthanes, fabrication de fibres synthétiques ;<br>– préparation des mousses polyuréthanes et application de ces mousses à l'état liquide ;<br>– fabrication et utilisation des colles à base de polyuréthanes ;<br>– fabrication et manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques. |
| Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 jours                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Syndrome bronchique récidivant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 jours                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 jours                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 jours                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë d'hypersensibilité objectivée par :<br>- des signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou des signes généraux ;<br>- des signes radiographiques et/ou tomodensitométriques compatibles, lorsqu'ils existent ;<br>- une diminution de la DLCO ou une hypoxie d'effort ;<br>- des signes immunologiques significatifs : présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, à défaut, lymphocytose au lavage broncho-alvéolaire. | 30 jours                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pneumopathie d'hypersensibilité chronique avec altération des explorations fonctionnelles respiratoires (trouble ventilatoire restrictif ou obstructif), signes radiologiques compatibles et signes immunologiques significatifs : présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, à défaut, lymphocytose au lavage broncho-alvéolaire.                                                                                                                                | 3 ans                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |